




ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА И ИММУНОДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

ТУБЕРКУЛЕЗ – это хроническая бактериальная инфекция, которая занимает одно из первых мест в мире по показателям заболеваемости и смертности. Заражение происходит воздушно-капельным путем от больных, которые выделяют микобактерии туберкулеза с мокротой при разговоре, кашле, чихании.

**НАИБОЛЕЕ
ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ
ТУБЕРКУЛЕЗА ВОЗНИКАЮТ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА**

**НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ
ОТ ВАКЦИНАЦИИ, ПРИ
ЗАРАЖЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ОНА СОХРАНИТ
РЕБЕНКУ ЖИЗНЬ!**

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА проводится детям на **3-7 СУТКИ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ** в родильном доме (**САКЦИНАМИ БЦЖ** или **БЦЖ-М**). Вакцинация против туберкулеза защищает от наиболее тяжелых, смертельных форм заболевания.

Далее в течение жизни ребенка ежегодно медицинскими работниками осуществляется диагностика туберкулеза, для чего проводится внутрикожная туберкулиновая **ПРОБА МАНТУ И ПРОБА С ДИАСКИНТЕСТОМ**.

**ТУБЕРКУЛИН
И ДИАСКИНТЕСТ
НЕ ОПАСНЫ
ДЛЯ РЕБЕНКА!**

**ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА
ДО 7 ЛЕТ И ДИАСКИНТЕСТ
С 8 И ДО 14 ЛЕТ - ЭТО
ЕДИНСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ,
КОТОРЫМИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ
ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ
ИНФЕКЦИЮ У ДЕТЕЙ**

**ДЕТЯМ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
С 15 ЛЕТ** дополнительно к пробе с Диаскинтестом проводят **ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ** органов грудной клетки.

